

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

28.11.06 № 478

Реєстраційне посвідчення

№ 0A/3368/02/0

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТРОКСЕВАЗИН®
(TROXEVASIN®)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: troxerutin;*

2-[3,4-(бис(2-гідроксіетокси)феніл)-3-[[6-О-(6-дезоксі-альфа-L-манопіранозил)-бета-D-глюкопіранозил]окси]-5-гідрокси-7-(2-гідроксіетокси)-4Н-1-бензопіран-4-он;

основні фізико-хімічні властивості: тверді циліндричні желатинові капсули жовтого кольору (жовтий/жовтий); вміст капсул – порошок від жовтого до жовто-коричневого кольору;

склад: 1 капсула містить

троксерутину

300 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактози моногідрат;

склад твердої желатинової оболонки: сансет жовтий E110, хінолін E104, титану діоксид E171, желатин.

Форма випуску. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби.
Код АТС– С05СА04.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Троксевазин – це суміш біофлавоноїдів, яка містить не менше 95% троксерутину. Він зменшує підвищену проникність капілярів і збільшує тонус вен. Є антагоністом вазодилататорних ефектів гістаміну, брадикініну і ацетилхоліну. Діє протизапально на перивенозну тканину. Стабілізує стінки капілярів і виявляє помірну антиагрегантну дію. Зменшує набряк, усуває біль, поліпшує трофіку та інші патологічні прояви, пов'язані з венозною недостатністю. Завдяки цим властивостям Троксевазин виявляє венотонічний, капіляротонічний, протиексудативний і гемостатичний ефект.

Фармакокінетика. Половина застосованої пероральної дози Троксевазину резорбується в шлунково-кишковому тракті протягом перших 3 годин і виводиться із сечею (20-22%) і жовчю (60%). Більша частина резорбованих три-, ди- та моногідроксиетилрутозидів елімінується з жовчю і значно менше – нирками. Тетрагідроксиетилрутозид досягає максимальних плазмових концентрацій після перорального застосування в середньому за 4 години; 15% застосованої дози елімінується нирками протягом перших 24 годин.

Показання для застосування. Троксевазин капсули застосовуються для симптоматичного лікування таких захворювань:

