

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства охорони
здоров'я України**

15.12.08 № *834*

Реєстраційне посвідчення
№ *UA/5608/01/01*

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

**ФОЗИКАРД Н
(FOSICARD H)**

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: світло-помаранчеві, круглі, плоскі, без оболонки з маркуванням "FH" з одного боку, допускається наявність мармуровості.

склад: 1 таблетка містить

фозиноприлу натрієва сіль 20 мг;

гідрохлортіазид 12,5 мг.

допоміжні речовини: лактози моногідрат, лактози моногідрат (таблетоза 80) кроскармелоза натрію, крохмаль 1500, гліцерилу дибегенат, суміш пігментів RB-23601 Orange(титану діоксид, лактози моногідрат, заліза оксид жовтий, заліза оксид червоний).

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати Інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ).

Код АТС С09В А09.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Фозиноприл є пролікарським засобом, складним ефіром фозиноприлату – інгібітора ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ) пролонгованої дії. Після прийому всередину фозиноприл швидко і повністю перетворюється шляхом гідролізу в фозиноприлат, що є активним інгібітором АПФ. Препарат викazuje гіпотензивну, вазодилатуючу, діуретичну та калійзберігаючу дію. Знижує загальний периферичний опір судин і системний артеріальний тиск. Препарат пригнічує синтез альдостерону та інгібує тканинний ангіотензин-перетворюючий фермент (АПФ).

Гідрохлортіазид діє на механізм реабсорбції електролітів в ниркових каналцях, підвищуючи виділення іонів калію і гідрокарбонату. Підвищує активність реніну плазми крові, секрецію альдостерону і знижує концентрацію іонів калію в сироватці крові.

Фозиноприл і гідрохлортіазид мають адитивну дію. Фозиноприл зменшує втрату іонів калію, що спричинена гідрохлортіазидом.

Після прийому внутрішньо зниження артеріального тиску(АТ) починається через 1 годину, досягає максимальних значень через 2 - 6 годин. Зниження показників АТ через 24 години становить 60 - 90% від максимального зниження АТ, що дозволяє приймати препарат 1 раз на добу.

